



## EPR 1 & 2 - Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups

**Nieuw!**

Zonnige plek

Overwegend droge grond

80-100 cm

Bloeitijd mei-september

1-2 x per jaar maaien & afvoeren

Bijen, vlinders & vogels

Bloei vanaf het 2<sup>e</sup> jaar

Permanente invulling

### Karakter

De duurzame manier om de eikenprocessierups te bestrijden is het bevorderen van biodiversiteit, zodat natuurlijke vijanden een plaag voorkomen. Hiervoor zijn twee inheemse bloemenweidemengsels samengesteld\*\*. Daarnaast biedt het mengsel voedsel en leefgebied aan andere insecten.

### Grondsoort

Alle zandgronden en alle kleiige en lemige gronden.

### Zaaidichtheid

Gemiddeld 1-1,5 g/m<sup>2</sup>.

### Zaaiperiode

Eind juli - oktober (november) of februari - maart (half april).

### Beheer

Maai op schralere zandgronden eenmaal in september-oktober. Voor voedselrijke zand-, klei- en leemgronden is tweemaal per jaar gefaseerd maaien aanbevolen. Laat direct om de bomen de vegetatie ongemoeid en laat ook het stamschot op de bomen staan.

### Toepassingsmogelijkheden

Brede bermen en andere zonnige plaatsen binnen een straal van 100 m van eiken(lanen). Ook geschikt voor het buitengebied. Zaaï niet direct onder eiken, want daar is het vaak te schaduwrijk en te droog.

### Tip!

Combineer het mengsel met autochtoon inheems struweel in de nabije omgeving.

### Soortenlijst EPR 1 & 2-mengsel\*

<i>Achillea millefolium</i>	Duizendblad
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Fluitenkruid
<i>Centaurea jacea</i>	Knoopkruid
<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Wilgenroosje
<i>Crepis capillaris</i>	Klein streepzaad
<i>Daucus carota</i>	Peen
<i>Galium mollugo subsp. erectum</i>	Glad walstro
<i>Heracleum sphondylium subsp. sphondylium</i>	Gewone berenklaauw
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewoon biggenkruid
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Gewone margriet
<i>Linaria vulgaris</i>	Vlasbekje
<i>Medicago lupulina</i>	Hopklaver
<i>Plantago lanceolata</i>	Smalle weegbree
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewone brunel
<i>Ranunculus acris</i>	Scherpe boterbloem
<i>Scorzoneroides autumnalis</i>	Vertakte leeuwentand
<i>Silene dioica</i>	Dagkoekoeksbloem
<i>Tanacetum vulgare</i>	Boerenwormkruid
<i>Trifolium pratense</i>	Rode klaver
<i>Vicia cracca</i>	Vogelwikke

\* Verkorte lijst met gezamenlijke soorten. EPR1 is voor lichte grond. EPR2 is voor zware grond. Scan voor de complete lijst per grondsoort de QR-code onderaan de pagina.

\*\* De selectie van soorten in deze mengsels is mede gebaseerd op onderzoek van Storix Boom- en Landschapsbeheer.



Meer weten over EPR1 of bestellen?



Meer weten over EPR2 of bestellen?

