



## O3 - Tijdelijke onderbegroeiing voor bosplantsoen

Zonnige plek

Overwegend droge grond

Gem. 50 cm

Bloeitijd mei-september

1-2 x per jaar maaien & afvoeren

Bijen & vlinders

Bloei vanaf het 1<sup>e</sup> jaar

Bloemrijk tot struweel dichtgroeit

### Karakter

Bosplantsoen ziet er de eerste jaren na aanplant vaak nog wat kaal en armoedig uit. Ook kunt u veel last hebben van allerlei onkruiden die de jonge struiken en bomen overwoekeren. Door dit mengsel tussen de jonge aanplant te zaaien, zorgt u voor onderdrukking van de onkruiden en heeft u vanaf het eerste jaar na aanplant totdat de vegetatie zich sluit een kleurrijk beeld. De soorten zelf concurreren nauwelijks met de jonge aanplant. De klaversoorten uit het mengsel binden bovendien stikstof uit de lucht, waar de struiken en bomen van profiteren.

### Grondsoort

Alle grondsoorten.

### Zaadichtheid

0,5-1 g/m<sup>2</sup>.

### Zaaiperiode

Na aanplant van bosplantsoen, mits vorstvrij, of eind juli - oktober (november) of februari - maart (half april).

### Beheer

Eén tot twee keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren. Maai het eerste jaar na aanleg pas nadat de akkerbloemen uitgebloeid zijn.

### Toepassingsmogelijkheden

Tuinen, openbare ruimte en buitengebied bij jonge bosaanplant.

### Tip!

Zaai dit mengsel nadat het bosplantsoen is aangeplant.

### Soortenlijst O3-mengsel

<i>Achillea millefolium</i>	Duizendblad
<i>Centaurea cyanus</i>	Korenbloem
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewoon biggenkruid
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Gewone margriet
<i>Lotus corniculatus var. corniculatus</i>	Gewone rolklaver
<i>Matricaria chamomilla</i>	Echte kamille
<i>Medicago lupulina</i>	Hopklaver
<i>Papaver rhoeas</i>	Grote klaproos
<i>Plantago lanceolata</i>	Smalle weegbree
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewone brunel
<i>Rumex acetosella</i>	Schapenzuring
<i>Silene dioica</i>	Dagkoekoeksbloem
<i>Trifolium pratense</i>	Rode klaver
<i>Trifolium repens FG</i>	Witte klaver
<i>Tripleurospermum maritimum</i>	Reukeloze kamille



Meer weten of bestellen?

